

Connaissance des oiseaux : Les inséparables

Agapornis ssp

Nom scientifique = Nom commun :

Agapornis roseicollis = Inséparable à face rose/ rose gorge

Agapornis fischeri = Inséparable de Fischer

Agapornis personata = Inséparable masqué ou Inséparable à tête noire

Famille : Psittacidés

Origine : Afrique

Espérance de vie: 10 à 15 ans, quelques fois plus de 20 ans

Taille : 15cm

Description :

L'inséparable de Fisher (*Agapornis Fischeri*) est une des espèces les plus répandues en captivité. Cette espèce fut découverte par le Dr. Fischer en 1817 en Tanzanie. L'inséparable de Fischer est vert, plus foncé (pratiquement vert olive) sur les ailes et le dos, et plus clair au niveau de la poitrine. Le dessus de sa tête est rouge, ses joues et sa gorge sont d'une couleur orangée. Le bec est rouge vif



L'inséparable masqué (*Agapornis Personata*), très populaire en captivité, a le plumage généralement vert avec la tête et les joues d'un noir fumé. Son collier est jaune et son bec rouge vif. Son aire de répartition, dans la nature, est le nord-est de la Tanzanie jusqu'au sud-est du Kenya. Il existe des mutations dont le bleu



L'inséparable à face rose (*Agapornis Roseicollis*) est de loin le plus connu en captivité. Il a le plumage en majorité vert et sa tête est de couleur rose pêche. Dans la nature, nous le retrouvons en Namibie, en Angola, au Botswana et en Afrique du Sud.

Il y a 17 mutations connues d'inséparables à face pêche, qui donnent lieu à une panoplie inimaginable de couleurs dont le turquoise. Son bec est clair.



Le bec des inséparables est puissant et peut engendrer des dégâts ou des blessures.

Dimorphisme sexuel : inexistant

Comportement : Les inséparables doivent cohabiter entre eux car ils peuvent être très agressifs (surtout pendant la période de reproduction). Seul de très grandes volières (de plusieurs mètres) permettent des mélanges. Le nombre d'inséparable dépendra de la place disponible dans la cage/volière.



Connaissance des oiseaux : Les inséparables

Il est préférable de les maintenir en couple, voire simplement par paires (2 mâles ou 2 femelles) car ce sont des animaux grégaire et sociable, l'Agapornis survit rarement à la solitude.

Les inséparables sont des oiseaux très agiles et vifs qui aiment voler et grimper. Ce sont de grands acrobates possédant des pattes puissantes. Ils utilisent également leur bec pour grimper et se déplacer le long du grillage de la cage. Ils sont plus habiles en se déplaçant ainsi que sur le sol mais ils marchent malgré tout aisément par terre pour rechercher de la nourriture.

Les inséparables se tiennent parfois sur une seule patte. C'est un signe d'apaisement qui montre qu'ils se sentent en sécurité.

Cris: perçants, métalliques et souvent aigus, ils peuvent être très bruyants.

Cage : Les petites cages ne sont pas adaptées, privilégier une cage spacieuse ou une volière (plus c'est grand plus on favorisera leur bien-être).

Dès leur arrivée à la maison, placez les oiseaux dans une vaste cage que vous aurez au préalable préparée dans un endroit calme et où règne une température stable, jamais en plein soleil.

Il est déconseillé d'installer la cage dans la cuisine ou la salle de bain car un oiseau est fragile : il lui faut une température (entre 17 °C et 22) et une hygrométrie aussi stable que possible, loin des fumées (de cigarettes) et des vapeurs de cuisine. Si vous choisissez votre chambre, attention car ils peuvent être bruyants.

Il faudra mettre à disposition des branches fraîches et tendres pour que vos oiseaux puissent ronger et user leur bec à volonté.

Perchoirs adaptés et branches fraîches d'arbres fruitiers ou noisetier ou de saule **non traités**, que l'on remplacera régulièrement.

Fond de cage : sable type grit

Nourriture : Granivores, mélange de graine grande s perruches ou mélange spéciale inséparables.



Granulés complets



Granulés complets



Mélange de graines

Un mélange de graines seul est insuffisant. Un apport en vitamines est nécessaire : pâtée aux œufs, verdure, graines germées. A compléter avec des fruits et légumes (2 à 3 fois par semaine) ou des aliments en forme de granulés. Il apprécie aussi le millet en grappe.


Un os de seiche et/ou un bloc de minéraux doivent être présent en permanence dans la cage ou volière.

Connaissance des oiseaux : Les inséparables

L'eau sera propre et changer tous les jours.

Tout changement de nourriture doit s'effectuer très progressivement.

Reproduction : Nid boîte ou en forme de tronc fermé



Une fois le nid garni, la femelle va commencer sa ponte. Elle pondra un œuf tous les 2 jours. La ponte est généralement de 5 œufs.

La couvaison commence souvent lorsque le 2ème œuf est pondu (mais cela varie selon les femelles) et dure environ 23 jours.

Les jeunes quittent le nid vers 6 semaines mais sont encore nourris 2 semaines.

Vers l'âge de 2 mois, les jeunes sont généralement sevrés. Il faut alors les séparer des parents.

Il est conseillé de limiter les couvées à 2 par an.

Statut juridique : Domestique en France pour les espèces roseicolti, personata et fischeri

- les variétés domestiques de l'inséparable à face rose (Agapornis roseicolis) ;
 - les variétés domestiques de l'inséparable de Fischer (Agapornis fischeri) ;
 - les variétés domestiques de l'inséparable masqué ou à tête noire (Agapornis personatus) ;
- Extrait de l'arrêté du 11 Aout 2006 sur les espèces*

Les Agapornis sauvages sont espèces protégées par la convention de Washington (CITES) mais leurs importations sont interdites en Europe.

Origine du nom scientifique :

Agapornis vient du grec « agape », amour et « ornis », oiseau.

Roseicolti : Leur nom vient du grec « roseus = couleur rose » et de « collum = cou ».

Quelques mutations :

Ins. Roseicolti lutino



Ins. Personata bleus



Ins. Roseicolti bleu



Ins. Fischeri olive